

Số: 593/UBND-NN&PTNT  
V/v chủ động phòng trừ rầy nâu,  
rầy lưng trắng hại lúa xuân 2017.

Hoàng Hoá, ngày 10 tháng 5 năm 2017

Kính gửi: Chủ tịch UBND 43 xã, thị trấn.

Hiện nay, diện tích lúa vụ chiêm xuân đã trở xong, đang giai đoạn chín sữa. Những ngày qua do nắng nóng và nhiệt độ tăng cao phổ biến từ 32-33<sup>0</sup>C và xen kẽ có mưa rào và giông là điều kiện thuận lợi cho rầy nâu, rầy lưng trắng phát sinh gây hại. Qua kiểm tra, theo dõi một số diện tích lúa tại các xã: H.Châu, H.Thanh, H.Hải, H.Yên, H.Tiến, H.Ngọc, H.Đạo, H.Đạt, H.Cát...rầy nâu, rầy lưng trắng gây hại cục bộ với mật độ phổ biến từ 500-800 con/m<sup>2</sup>, cá biệt có nơi cao 1.7000 con/m<sup>2</sup> trên các giống lúa nếp, Bắc thơm số 7, LT2, Thái xuyên 111, VT 404... Dự báo trong những ngày tới rầy tiếp tục phát sinh lứa 3 gỏi lứa 2 nên khó tránh khỏi nguy cơ cháy chòm, cháy ổ, đặc biệt trong điều kiện thời tiết nắng nóng, và có mưa giông nên rầy lúa 3 nở rộ, phát sinh với mật độ cao gây hại lúa cho đến trước khi thu hoạch. ***Nếu không khoanh vùng, có biện pháp phòng trừ triệt để kịp thời thì nguy cơ cháy rầy cục bộ sẽ xảy ra.*** Để chủ động phòng trừ, giảm thiểu tối đa thiệt hại do cháy rầy gây ra. Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, các phòng, ngành chức năng thực hiện ngay các nhiệm vụ sau đây:

1. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chỉ đạo Ban nông nghiệp xã, trưởng thôn và nông dân trực tiếp thăm đồng thường xuyên nhất là những vùng thường xảy ra cháy rầy, khi phát hiện rầy nâu, rầy lưng trắng gây hại khoanh vùng những diện tích lúa bị nhiễm rầy, hướng dẫn đôn đốc thực hiện biện pháp phun trừ triệt bằng một trong các loại thuốc đặc trị trừ rầy “ ***chỉ phun trừ sau khi kiểm tra phát hiện rầy đến ngưỡng nhằm tránh phun thuốc tràn lan trên diện rộng gây lãng phí***”, cụ thể:

- Khi mật độ rầy cao trên 750 con/m<sup>2</sup>, lá lúa còn xanh cần sử dụng các loại thuốc hóa học nội hấp, lưu dẫn như: Actara 25WG, Chess50WG, LK-setup 75WP, Sutin 5EC phun không cần rẽ lúa để kéo dài hiệu lực trừ rầy.

- Khi lúa bước vào giai đoạn chắc xanh trở đi mật độ rầy tăng cao thì sử dụng thuốc tiếp xúc, xông hơi khi phun thuốc phải rẽ hàng từ 0,8-1,0m phun trực tiếp vùng thân gốc lúa để thuốc tiếp xúc trực tiếp với rầy bằng các loại thuốc: Bassa 50ND, Victory 585EC, Penalty Gold 50EC. Phun thuốc trừ rầy phải đảm bảo nước mặt ruộng từ 5-7 cm và đủ lượng nước thuốc thì trừ rầy mới đạt hiệu quả cao.

Ngoài ra cần tăng cường theo dõi diễn biến bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn để có biện pháp phòng trừ hiệu quả và thu gom vỏ bao bì sau khi sử dụng đúng nơi quy định.

2. Phòng NN&PTNT, Trạm BVTV, Trạm khuyến nông huyện phân công cán bộ công chức, viên chức phối hợp với UBND các xã, thị trấn trực tiếp kiểm tra, hướng dẫn nông dân các biện pháp phòng trừ rầy nâu và chỉ sử dụng thuốc hóa học khi mật độ rầy tới ngưỡng đe dọa năng suất lúa.

3. Chi nhánh thủy lợi Hoàng hóa đảm bảo đủ nước cho cây lúa thời kỳ phơi màu kết hạt và phòng rầy nâu từ nay đến cuối vụ.

Trên đây là một số nội dung trọng tâm chỉ đạo sản xuất vụ xuân 2017 trong thời gian tới. Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; các phòng, ngành chức năng nghiêm túc thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- CT, các PCT UBND huyện (b/c);
- UBND 43 xã, thị trấn (T/h);
- Trạm K.nông; trạm BVTV(T/h);
- Chi nhánh thủy lợi Hoàng Hoá (T/h);
- Phòng NN&PTNT(T/h);
- Đài truyền thanh huyện(đưa tin);
- Lưu VT.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Đình Tuy**